



سازمان تحقیقات علمی و فناوری های سلول های بنیادی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با اسمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
مرکز ملی پژوهش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
معاونت دانش پژوهان جوان



ماح

باشگاه دانش پژوهان جوان

مبارزه‌ی علمی برای جوانان، زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت‌های است. «امام خمینی (ره)»

دفترچه‌ی سؤالات مرحله‌ی اول

اولین دوره‌ی المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور سال ۱۳۹۴

صبح - ساعت: ۹:۰۰

کد دفترچه : ۱

تعداد سوالات	مدت آزمون (دقیقه)
۶۰	۱۲۰

نام : نام خانوادگی : شماره صندلی :

توضیحات مهم

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.


۱. کد برگه‌ی سؤالات شما ۱ است. این کد را در محل مربوط روی پاسخ‌نامه‌ی شما تصحیح نخواهد شد. دقت کنید کد برگه‌ی سؤالات شما که در بالای هر یک از صفحه‌های این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است یکی باشد.
۲. بلافضله پس از آغاز آزمون تعداد سؤالات داخل دفترچه و وجود همه‌ی برگه‌های دفترچه‌ی سؤالات را بررسی نمایید. در صورت وجود هرگونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلع کنید.
۳. یک برگ پاسخ‌نامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخصات شما بر روی آن نوشته شده است. در صورت نادرست بودن مشخصات برگ، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطلع کنید.
۴. برگه‌ی پاسخ نامه را دستگاه تصحیح می‌کند، پس آن را تا نکید و تمیز نگه دارید، پاسخ هر پرسش را با مداد مشکی نرم در محل مربوط علامت بزنید. خانه‌ی مورد نظر را کاملاً سیاه کنید.
۵. پاسخ درست به هر سوال ۴ نمره مثبت و پاسخ نادرست یک نمره منفی دارد.
۶. همراه داشتن هرگونه کتاب، جزو و جدول تابوی عناصر مجاز نمی‌باشد.
۷. همراه داشتن لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه و لپ تاپ ممنوع است. همراه داشتن این قبیل وسایل حتی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلب محسوب خواهد شد.
۸. شرکت‌کنندگان در دوره‌ی تابستانی از بین دانش‌آموزان پایه‌ی دوم و سوم دیبرستان انتخاب می‌شوند.
۹. داوطلبان نمی‌توانند دفترچه‌ی سؤالات را با خود ببرند. (دفترچه بایدهمراه پاسخ نامه تحويل داده شود.)

کلیه‌ی حقوق این سؤالات برای باشگاه دانش پژوهان جوان محفوظ است

باسم‌هه تعالی

سوالات آزمون اولین المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران (بخش شیمی)


۱- همان گونه که می‌دانید جهت استفاده در کشت سلول باید از آب مقطر استفاده شود. به نظر شما در کدام یک از حالت‌های تهیه‌ی آب مقطر زیر دماسنچ درجه‌ی بالاتری را هنگام جوشیدن مایع نشان خواهد داد؟



۲- یک نوع محیط کشت به نام DMEM/F12 وجود دارد که اغلب برای کشت رده‌های سلولی مختلف به کار می‌رود و بعضی از اجزای آن به شرح جدول زیر می‌باشد. پژوهشگری قصد دارد تاثیر غلظت دو برابر کات کبود را بر میزان رشد رده‌ی سلول خاصی بررسی کند و به این منظور پس از افزودن ۴۰ گرم نمک فوق ۹۰ گرم محلول سیر شده به دست می‌آورد. انحلال پذیری نمک در دمای مذکور چقدر بوده است؟

غلفت mg/L	نام ماده		
۰/۰۰۳۵	بیوتین	۴۵ (۲)	۳۲ (۱)
۱۱۶/۶	کلسیم کلرید	۸۰ (۴)	۶۴ (۳)
۸/۹۸	کولین کلرید		۱۲۰ (۵)
۰/۰۰۱۳	مس (II) سولفات		
۲/۲۴	D-کلسیم پنتوتنات		
۳۱۵۱	D-گلوکز		
۰/۰۵	فریک نیترات		
۰/۴۱۷	فریک سولفات		
۲/۶۵	فولیک اسید		
۱۸/۷۵	گلیسین		

۳- دانشمندی برای بررسی غشای سلول از فرمول زیر جهت تهیه غشای مزبور استفاده کرده است که در حین آزمایش مقداری از مواد اولیه بر روی روپوش او می ریزد. بهترین حلال برای از بین بردن هر دو ماده ای اولیه کدام می باشد؟



- ۱) آب داغ ۲) تراکلرواتن ۳) سدیم دو دسیل بنزن سولفات
 ۴) صابون جامد ۵) رسوپ دهندہ کوتول

۴- با توجه به داده های زیر در صورت استفاده کدام گاز زیر در چراغ بونزن جهت استریل کردن وسایل اتاق عمل گرمای حاصل از سوختن یک گرم آن بیشتر خواهد بود؟

پنتان	بوتان	پروپان	اتان	متان	هیدروکربن
۳۵۱۴	۲۶۵۷	۲۰۴۶	۱۴۱۳	۸۰۲	گرمای سوختن Kj/mol

$C_1 H_4$ (ethane) $C_2 H_6$ (ethene) $C_3 H_8$ (propane) $C_4 H_{11}$ (butane) $C_5 H_{12}$ (pentane)

۵- دانشمندی تاثیرات زیر را در مجاورت سلول های بینیادی یا مواد شیمیایی مشاهده نمود :

نام ماده	نام دانشمند	تأثیرات
آسپرین	Y.Wang	کاهش رشد سلول های بنیادی مزانشیمی
منتول	C.Juan	کاهش تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول چربی
ایبوپیروفن	U.Wallengist	کاهش اثرات التهابی بعد از پیوند سلول های بنیادی عصبی

از نظر فرمول ساختاری چند مورد در این سه دارو مشترک می باشد؟

وجود گروه عاملی الکلی -

وجود حلقه شش ضلعي -

- وجود حلقة بنزني

وجود عامل کربوکسیل -

وجود پیوند دوگانه -

- (۱) ۵ مورد (۲) ۴ مورد (۳) ۳ مورد (۴) ۲۶۴ مورد (۵) یک مورد

۶- در عناصر جدول مندیلیف در تناوب دو، سه، چهار و پنجم جمعاً چند فلز حضور دارد؟

۳۱(۵)

۳۲(۴)

۳۳۳

۳۴ (۲)

۳۵ (۱)

۷- در مورد یون‌ها چند مورد صحیح است؟

- نام یون کروم **III**، آهن **II** و مس **II** به ترتیب کرومیک، فرو و کوپر می باشد.
 - در کروم بر خلاف کبات و منگنز یون **II** کمتر از **III** متداول است.
 - یون های کوپریک و استانیک هر دو، ۲ ظرفیتی به شمار می روند.
 - **V** می توانند یون های **3+** تشکیل دهند.
 - یون فلزی موجود در سیزینه گیاهان و هموگلوبین هر دو **2+** می باشد.

۵) یک مورد

۲(۴) مورد

۳(۳) مورد

۴۲) مورد

۱) ۵مورد

۸- کدام گزینه ترتیب درست (چپ به راست) انرژی نخستین یونش ($kJ \cdot mol^{-1}$) عناصر تناوب سوم است؟

١) ٣٦٢ و ٢٩٧ و ٢٤٠ و ٢٣٨ و ١٣٦ و ١٧٥ و ١١٨

(۲) ۳۶۲ و ۲۹۷ و ۲۳۸ و ۲۴۰ و ۱۸۷ و ۱۷۵ و ۱۳۶ و ۱۱۸

(۳) ۳۶۲ و ۲۹۷ و ۲۴۰ و ۲۳۸ و ۱۸۷ و ۱۳۶ و ۱۷۵ و ۱۱۸

٤) ٣٦٢ و ٢٩٧ و ٢٤٠ و ٢٣٨ و ١٨٧ و ١٧٥ و ١٣٦ و ١١٨

(٥) ٣٦٢ و ٢٤٠ و ٢٩٧ و ٢٣٨ و ١٨٧ و ١٣٦ و ١٧٥ و ١١٨

۹- هرگاه ترتیب قرار گرفتن عناصر در جدول تناوبی به صورت شکل زیر باشد، تعداد الکترون‌های تراز $3d$ در اتم کدام ده عنصر بار است؟

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----

Cr₉Cu(δ)


V₉Cr(f)

Cr₉Mn (5)

Mn, Fe (%)

Ni₉Cu (1)


۱۰- چند مورد از موارد زیر به صورت قراردادی صحیح رسم شده اند؟




۱۱- یکی از روش هایی که ادعا می گردد در جوانسازی (Rejuvenation) نقش دارد به نام ازوون تراپی می باشد که طرفداران این فرضیه اعتقاد دارند به دلیل وجود ۳ اتم اکسیژن در ازوون امکان ترمیم بافتی آن بیش از اکسیژن عادی می باشد. هرگاه بداینیم گرمای تشکیل ازوون از اکسیژن برابر با KJ/mol ۱۴۳ باشد، از تجزیه $0/56$ لیتر گاز ازوون به اکسیژن چه مقدار گرما به ژول در همان شرایط آزاد خواهد شد؟ (حجم داده شده در شرایط STP بوده و قدر مطلق گرمای آزاد شده مورد نظر است)

۱۴۳۰ (۵) ۲۳۸۳ (۴) ۲۸۶۰ (۳) ۳۵۷۵ (۲) ۵۳۶۲ (۵) ۱

۱۲- محققی قصد دارد از آمینو اسید گلیسین در تولید یک پلیمر استفاده نماید. به نظر شما کدام ماده زیر حلال مناسب تری برای آن به شمار می رود؟



۱۳- یکی از روش های مناسب برای تزریق سلول ها در بدن استفاده از ژل ها می باشد. یکی از این ژل های مهم، پلیمری است به نام PLGA که واحد های سازنده ای آن مولکول های لاكتیک اسید و گلیکولیک اسید می باشد.



پژوهشگری به نام Lina DU به کمک همکاران خود قصد دارد هورمون آزاد کننده ای LH را -که از هیپو تالاموس ترشح می شود- در درون این ژل بارگذاری نماید و در این راستا ۳ نوع ژل مختلف با نسبت های مولی مختلف لاكتیک اسید (LA) و گلیکولیک اسید (GA) و به شرح جدول مقابل سنتز می کند. هرگاه DLC بیانگر میزان ظرفیت بارگذاری دارو (Drug loading capacity) باشد DT بیانگر زمان تخریب پذیری ژل و آزاد سازی دارو (Degradation time) باشد

بیشترین DT و DLC به ترتیب از راست به چپ مربوط به کدام ماده خواهد بود؟

نام ماده	علامت	LA	درصد	GA	درصد
A	۲۵:۷۵		۲۵		۷۵
B	۵۰:۵۰		۵۰		۵۰
C	۷۵:۲۵		۷۵		۲۵

A-A (۵)

A-C (۴)

C-A (۳)

C-C (۲)

B-B (۱)

۱۴- در مطالعات آزمایشگاهی به عمل آمده ، Bouvet Gerbettaz و همکارانش آنها متوجه گردیدند استفاده از لیزر دیودی با طول موج ۸۰۸ نانومتر سبب تکثیر و تمایز بهینه سلول های بنیادی مغز استخوان به رده ای سلولی استئوبلاست و استئوکلاست می شود. به نظر شما لیزر به کار رفته در این آزمایش در محدوده کدام موج الکترومغناطیس می باشد؟

(۵) فرابنفش

(۴) نور مرئی سبز

(۳) نور مرئی سرخ

(۲) فروسرخ

(۱) ریز موج ها

۱۵- در واکنش $KBrO_3 (S) + N_2 H_4 (g) \longrightarrow N_2 (g) + KBr(aq) + H_2 O$ پس از موازنی، نسبت ضریب مولی $KBrO_3$ به N_2 کدام است؟

- $\frac{2}{3} (5)$ $\frac{3}{2} (4)$ ۳ (۳) $\frac{1}{2} (2)$ ۲ (۱)

سوالات آزمون اولین المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران (بخش زیست و کتابچه تكمیلی)

۱۶- سلول های بنیادی خون ساز استخراج شده از مغز قرمز استخوان، پس از طی مراحل آماده سازی به منظور درمان بیماری لوسومی (نوعی سرطان خون) از طریق یک کاتتر وریدی به سیاهرگ تحت ترقوی چپ فرد بیمار تزریق شده اند، اولین بخشی که این سلول ها بلافضله بعد از تزریق از آن عبور می کنند کدام است؟

- (۱) شش راست (۲) شش چپ (۳) سرخرگ ششی (۴) دهلیز راست (۵) دهلیز چپ

۱۷- کدام با دخالت اعصاب خودمخたر و اعصاب پیکری انجام می شود؟

- (۱) انعکاس زردبی زیر زانو (۲) انعکاس تغییر قطر مردمک در برابر نور (۳) انعکاس دفع ادرار (۴) انعکاس بسته شدن پلک (۵) انعکاس تغییر ضخامت عدسي (تطابق)

۱۸- کدام دارای حرکات دودی (Peristalsis) هستند؟

- (۱) مری، میزراه، سرخرگ، میزانی، لوله فالوپ (۲) روده باریک، نفرون، لوله فالوپ، مری، میزانی (۳) سیاهرگ، روده باریک، معده، میزراه، مری (۴) لوله فالوپ، میزانی، روده بزرگ، میزراه، معده (۵) سرخرگ، مری، روده باریک، معده، سیاهرگ

۱۹- برای مطالعه نقش میکروتوبول ها در ترابری درون سلولی، کدام مناسب تر است؟

- (۱) دندربیت نورون های حسی (۲) آکسون نورون های حسی (۳) نوروپلاسم نورون های رابط (۴) دندربیت نورون های حرکتی (۵) آکسون نورون های حرکتی

۲۰- در تشکیل کدام اندام، سلول هایی از دو لایه‌ی مختلف جنین گاسترولایی مشارکت دارند؟

- (۱) پوست (۲) مثانه (۳) کبد (۴) کلیه (۵) مغز

۲۱- تولد فرزندی با کدام ترکیب کروموزومی را میتوان به وقوع اختلال در جدا نشدن کروماتیدهای کروموزوم های جنسی در مرحله آنافاز II اسپرماتوژندر پدر نسبت داد؟

الف: XXX: ب: YO: ج: XYY: د: XO:

(۱) الف، ب، د (۲) ب، د، ۵ (۳) الف، ۵ (۴) ب، ج (۵) ب، ۵

۲۲- از هیدرولیز ۴۰ ملکول مالتوز، ۳۰ ملکول ساکارز در محیط آبی، درمجموع چه تعداد ملکول آب مصرف می شود و قند گلوکز چه نسبتی از مونومرهای حاصل را تشکیل می دهد؟

(۱) ٪۷۵-٪۷۷ (۲) ٪۵۰-٪۷۷ (۳) ٪۵۰-٪۷۹ (۴) ٪۵۰-٪۸۰ (۵) ٪۷۵-٪۸۰


۲۳- وقایع خاص مرحله پروفاز میتوز در سلول های سوماتیک (پیکری) کدام است؟

- | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| الف: حداکثر فشردگی کروماتین ها | ب: پلیمریزه شدن توبولینها | ج: دیفسفوریله شدن لامین ها |
| د: تخریب رشته های کینتوکوری | ه: دیپلیمریزیه شدن توبولین ها | و: فسفوریله شدن لامین ها |
| (۱) ب، ۵، و (۲) الف، ۵، ج (۳) ب، و، ج (۴) د، الف، و (۵) ب، د، الف | | |

۲۴- خون بند ناف منبع مناسبی برای استخراج سلول های بنیادی به شمار می رود، برای این منظور:

- (۱) از سرخرگ های بند ناف، سلول های بنیادی جنین و از سیاهرگ بندناف، سلول های بنیادی مادر استخراج می شود.
- (۲) از سرخرگ های بند ناف، سلول های بنیادی مادر و از سیاهرگ بندناف، سلول های بنیادی جنین استخراج می شود.
- (۳) از سرخرگ ها و سیاهرگ بند ناف، مخلوطی از سلول های بنیادی مادر و جنین استخراج می شود.
- (۴) از سرخرگ ها و سیاهرگ بند ناف، تنها سلول بنیادی مادر استخراج می شود.
- (۵) از سرخرگ ها و سیاهرگ بند ناف، تنها سلول بنیادی جنین استخراج می شود.

۲۵- محققی سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی را کشت داده و منحنی رشد زیر را برای آن بدست آورده است. این سلول ها در کدام مرحله بیشترین ناپایداری و آسیب پذیری را خواهند داشت؟




(۱) B و A (۲) B (۳) C و B (۴) C (۵) D

- ۲۶- در درمان کدام بیماری توأم کردن استفاده از سلول های بنیادی و ژن درمانی، انتخاب مناسب تری است؟
- ۱) انفارکتوس قلبی ۲) آرتروز ۳) آنمی داسی شکل ۴) آب مروارید ۵) راشیتیسم

- ۲۷- در صورتی که سنتز یک رشته پلی پپتیدی با ۵۰ آمینو اسید در E.coli حدوداً ۲۵ ثانیه طول بکشد، سرعت جابجایی ریبوزوم بر روی mRNA به طور تقریبی چقدر بوده است؟ (N/S: نوکلئوتید بر ثانیه)
- ۱) ۲ N/S ۲) ۳ N/S ۳) ۴ N/S ۴) ۶ N/S ۵) ۲۰ N/S

- ۲۸- در روش هم جوشی پروتوبلاست ها، به منظور حذف دیواره سلولی سلول های گیاهی، از کدام آنزیم ها استفاده می شود؟
- ۱) آمیلاز - پروتئاز ۲) سلولاز - لیپاز ۳) پروتئاز - سلولاز ۴) لیپاز - آمیلاز ۵) پروتئاز - لیپاز

- ۲۹- ماده هماتوکسیلین که در شکل زیر مشاهده می گردد، از جمله رنگ هایی است که در کنار سایر ترکیبات در رنگ آمیزی سلول ها استفاده می شود. در صورت استفاده از آن، کدام جزء سلولی بیشتر و بهتر رنگ می گیرد؟



- ۱) پراکسی زوم ۲) شبکه آندوپلاسمی صاف ۳) شبکه آندوپلاسمی زبر ۴) سیتوسل
۵) غشاء میتوکندری

- ۳۰- در تبدیل سلول بنیادی به سلول های بالغ، در کدام مورد تمایز مورفولوژیک (ریخت شناسی) بیشتری در دستگاه گلثی و لیزوژوم ها صورت می پذیرد؟
- ۱) سلول T خاطره ۲) سلول های رنگدانه ای شبکیه ۳) اسپرم ۴) فیبروبلاست
۵) ماستوسيت

- ۳۱- چند نمونه از موارد زیر، نقش رنگ آمیزی سلول ها در مطالعات زیستی را به درستی بیان می کند؟
- * تشخیص سلول های زنده از سلول های مرده
 - * شناسایی روندهای متابولیکی مختلف در سلول
 - * افتراق اندامک های مختلف سلول از یکدیگر
 - * پی بردن به ماهیت شیمیایی بخش های مختلف سلول
 - * شناسایی و ردیابی ملکول های زیستی ویژه در سلول

- ۱) دو مورد ۲) سه مورد ۳) چهار مورد ۴) پنج مورد ۵) شش مورد

-۳۲- در پژوهشی پیوند اعضا به منظور کاهش هرچه بیشتر احتمال رد پیوند عضو پیوند شده، از مشتقات هورمون کدام غده استفاده زیادی میشود؟

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ۳) بخش درون ریز تیموس | ۲) بخش قشری فوق کلیه | ۱) بخش مرکزی فوق کلیه |
| | ۵) هیپوفیز پسین | ۴) هیپوفیز پیشین |

-۳۳- با در نظر گرفتن نقش های مختلف و متنوعی که ملکول های پروتئینی بر عهده دارند، نقش کدام پروتئین با پروتئین آلبومین قابل مقایسه است؟ (شبیه ترین مورد را انتخاب کنید).

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|
| ۵) کراتین | ۴) کازئین | ۳) میوزین | ۲) میوگلوبین | ۱) رنین |
|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|

-۳۴- Cluster Differentiation یکی از شاخص های سطح سلول و از روش های شناسایی تمایز سلولی است که با بررسی آنتی ژن های سطحی سلول ها انجام می شود و به اختصار به آن CD می گویند، به نظر شما امکان یافت شدن CD های مشترک بین کدام دو سلول بیشتر است؟

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| ۱) سلول T خاطره و ماکروفاز | ۲) سلول T کشنده و بازوفیل | ۳) پلاکت و اریتروسیت | ۴) اوزینوفیل و نوتروفیل |
| | ۵) سلول B خاطره و پلاسموسیت | | |

-۳۵- به منظور درمان نوعی بیماری متابولیکی ارثی در نوزادی شیرخوار، یکی از برادران این نوزاد کاندید مناسبی جهت اهدای Hematopoietic stem cell شناخته شده است، بیشترین تعداد این سلول ها را از کدام بافت فرد دهنده می توان تأمین نمود؟

- | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| ۱) بافت استخوان | ۲) بافت کبدی | ۳) مغز زرد استخوان | ۴) مغز قرمز استخوان | ۵) خون سیاه رگی |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------|

-۳۶- کدام یک از مواد زیر در مراحل کشت سلول معادل ضدیخ عمل می کند؟

- | | | | | |
|------|------|-----|------|-----|
| RPMI | DMEM | FBS | DMSO | PBS |
| ۵) | ۴) | ۳) | ۲) | ۱) |

-۳۷- طی یک پژوهش تعدادی سلول بنیادی با وارد نمودن ۴ ژن به خصوص در سلول های فیبروبلاست، تولید شده و اصطلاحاً برنامه ریزی مجدد گردیده اند، این سلول های بنیادی متعلق به کدام دسته می باشند؟

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ۱) سلول های بنیادی همه توان | ۲) سلول های بنیادی پرتونا | ۳) سلول های بنیادی چند توان | ۴) سلول های بنیادی تک توان |
| | ۵) سلول های بنیادی جنینی | | |


-۳۸- اگر در طی الکتروکاردیوگرافی، به فرد هورمون آدرنالین تزریق شود، کدام تغییر در الکتروکاردیوگرام مشاهده می شود؟

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| ۳) افزایش فاصله موج T تا موج S | ۲) افزایش ارتفاع موج T | ۱) کاهش فاصله موج T تا موج P |
| | ۵) کاهش ارتفاع موج QRS | ۴) افزایش فاصله موج T تا موج P |

۳۹- مورد استفاده "بن ماری" در آزمایشگاه سلول های بنیادی کدام است؟

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ۱) فریز کردن سلول ها | ۲) استریل کردن محیط کشت |
| ۳) شمارش تعداد سلول ها | ۴) دفریز کردن سلول ها |
| | ۵) استخراج سلول ها از محیط کشت |

۴۰- سلول های بنیادی خون ساز (Hematopoietic stem cells) قابلیت تمایز به سایر سلول ها یا بافت ها را دارا هستند و از این پدیده با عنوان Plasticity یاد می شود. در کدام مورد طی روند تمایز این سلول ها، واکنش های چرخه کربس حذف می شوند؟



۴۱- یک دختر بچه هفت ساله با عوارض نسبتاً شدید و پیش رفته نوعی بیماری ناشی از اختلال و راثتی اتوزومال مغلوب کاندید ژن درمانی گشته است. این دختر بچه احتمالاً به کدام بیماری مبتلا گشته است؟

- ۱) تالاسمی ۲) هموفیلی A ۳) PKU ۴) هانتینگتون ۵) DMD

۴۲- در پزشکی پیوندِ اعضاء، استفاده از بافت و عضو اهدایی از دوقلوهای همسان مناسب تر است و در اولویت قرار دارد، با این حال در درمان استفاده از بین دوقلو های همسان به اندازه پیوند سایر افراد موفقیت آمیز نیست.

- ۱) نارسایی پیش رفته کلیوی - عضو پیوندی ۲) تالاسمی مازور - مغز استخوان ۳) سوختگی شدید - پوست اهدایی
 ۴) آسیب شدید قرنیه - سلول های بنیادی ۵) انفارکتوس قلبی - سلول های بنیادی بند ناف

۴۳- در روش کشت «سلول های وابسته به بستر» به بسترهای خاصی نیاز است که این بسترهای با برخی پروتئین ها و ترکیبات بخصوص پوشیده شده اند، و بدین وسیله سلول ها بهتر به سطوح متصل می شوند. به منظور رشد اختصاصی سلول های بافت غضروف، به کارگیری کدام ترکیب در سطح محیط کشت مرسوم است؟

- ۱) لامینین ۲) انتاکتین ۳) فیبرونکتین ۴) الاستین ۵) کوندرونکتین

۴۴- در پژوهش های سلولی و در تکنیک کشت سلول های جانوری، استفاده از تریپسین به کدام منظور صورت می گیرد؟


- ۱) تخریب و گوارش سلول های مرده و حذف آنها از محیط کشت
- ۲) ممانعت از رشد میکروارگانیسم ها و جلوگیری از آسودگی میکروبی
- ۳) تحریک تقسیمات میتوуз و افزایش تعداد کلی سلولی در محیط کشت
- ۴) جدا کردن سلول ها از سطوح محیط کشت جهت انتقال به محیط جدید
- ۵) ایجاد شرایط مناسب محیطی جهت اتصال سلول های مشابه به یکدیگر

۴۵- در آزمایشگاه سلول های بنیادی جهت بررسی روزانه ای مورفولوژی سلول ها در محیط کشت و مشاهده مراحل تمایز این سلول ها به سلول های تخصص یافته، استفاده از کدام نوع میکروسکوپ مناسب تر است؟

- ۱) میکروسکوپ تداخلی
- ۲) میکروسکوپ معکوس
- ۳) میکروسکوپ اختلاف فاز
- ۴) میکروسکوپ فلوروستن
- ۵) میکروسکوپ زمینه سیاه

سوالات آزمون اولین المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران (بخش فیزیک)

۴۶- ظرفی حاوی مایعی به ضریب شکست $\sqrt{2}$ است. مطابق شکل آینه تختی را با زاویه θ نسبت به کف ظرف درون مایع قرار می دهیم. پرتو نوری که با زاویه تابش 45° درجه به سطح مایع می تابد پس از ورود به مایع و بازتاب از روی آینه نهایتاً مماس بر سطح مایع از آن خارج می شود. زاویه θ چند درجه است؟



۱۲/۵(۱)

۱۰/۵(۳)

۱۰/۵(۵)

۷/۵(۲)

۱۵(۴)

۴۷- در یک اتاق تمیز (Clean room) فاصله کانونی عدسی چشمی و فاصله کانونی عدسی شیئی میکروسکوپی به ترتیب 6 سانتی متر و 5 میلی متر و طول لوله میکروسکوپ $10/5$ سانتی متر است. در حالتی که تصویر نهایی از جسم مورد مطالعه در 30 سانتی متری عدسی چشمی تشکیل می شود. بزرگنمایی میکروسکوپ (نسبت طول تصویر نهایی به طول شیئی مورد مطالعه) چند است؟

۶۴/۵


۴۸/۴

۶۰/۳

۴۴ (۲)


۵۵ (۱)

۴۸- نمودار انرژی پتانسیل ذره هایی به جرم 20 g که از نقطه $x=0$ بدون سرعت اولیه رها می شود به صورت رو به رو است. ذره به کدام سمت حرکت می کند و سرعت بیشینه‌ی آن چند متر بر ثانیه است؟




- | | |
|-------------------------|---------------|
| ۱) راست، $\frac{17}{3}$ | ۲) راست، 20 |
| ۳) چپ، $\frac{17}{3}$ | ۴) چپ، 20 |
| ۵) راست، $\frac{22}{7}$ | |

۴۹- نمودار سرعت-زمان یک ذره در حال حرکت روی خط راست در شکل نشان داده شده است. شتاب ذره در نقاط A و B و C را با توجه به مثبت یا منفی بودن علامت آن از بزرگتر به کوچکتر مرتب کنید.




- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| $a_A > a_B > a_C$ (۲) | $a_c > a_A > a_B$ (۱) |
| $a_C > a_B > a_A$ (۴) | $a_B > a_A > a_C$ (۳) |
| $a_A > a_C > a_B$ (۵) | |

۵۰- مقداری گاز کامل در اثر فرآیند رو به رو از حالت ۱ به ۲ می رود. کدام گزینه درست است؟



- | | |
|------------------|------------------|
| $T_1 = 2T_2$ (۲) | $T_1 = 4T_2$ (۱) |
| $T_2 = 2T_1$ (۴) | $T_2 = 4T_1$ (۳) |
| $T_2 = T_1$ (۵) | |

۵۱- در دستگاه نشان داده شده در شکل با فرض آن که در هر بازه‌ی زمانی میزان گرمای وارد شده به میله‌ی مسی از سر داغ میله برابر با میزان گرمای خارج شده از سر سرد میله باشد، آهنگ ذوب یخ (جرم یخ ذوب شده در واحد زمان) کدام است؟ گرمای ذوب یخ L_v ، طول میله X رسانندگی گرمایی آن k و مساحت سطح مقطع آن A می‌باشد.



$$\frac{KAx}{(T_H - T_C)L_v} \quad (2)$$


$$\frac{KA}{xL_v} \quad (1)$$

$$\frac{KAxL_v}{T_H - T_C} \quad (4)$$

$$\frac{KA}{xL_v} \quad (3)$$

$$\frac{KAx}{T_H - T_C} \quad (5)$$

۵۲- مطابق شکل نیمی از حلقه رسانا درون میدان مغناطیسی قرار دارد. راستای میدان عمود بر سطح حلقه است. اگر شدت میدان مغناطیسی سریعاً افزایش یابد چه بر سر حلقه می‌آید؟



۱) حلقه به سمت بالای کاغذ هل داده می‌شود.

۲) حلقه به سمت پایین کاغذ هل داده می‌شود.

۳) حلقه به سمت راست کاغذ هل داده می‌شود.

۴) حلقه به سمت چپ کاغذ هل داده می‌شود.

۵) حلقه در محل خود ثابت می‌ماند.

۵۳- دو قرص هم اندازه فلزی با بارهای هم اندازه و ناهمنام 20 nc و $+20\text{ nc}$ - روبه روی هم و موازی با یکدیگر به فاصله x از هم قرار گرفته‌اند، به طوری که خط فاصل مراکز دو قرص بر صفحه آن‌ها عمود است، مساحت هر یک از دو وجه قرص‌ها 200 است. برای محاسبه نیروی الکتریکی که هر یک از قرص‌ها به قرص دیگر وارد می‌کند می‌توان فرض کرد میدان الکتریکی ناشی از هر قرص در محل دیگری یکنواخت، هم اندازه با نصف میدان الکتریکی درون دو قرص و هم جهت با آن است. یکی از قرص‌ها را ساکن نگه داشته و قرص دیگر را به آرامی به اندازه 0.88 cm از قرص ساکن دور می‌کنیم. کار نیروی الکتریکی وارد به قرص متحرک چقدر است؟ ضریب گذردهی الکتریکی خلا (ϵ_0) برابر با

$$(1\mu J) = 10^{-9} \text{ F/m}^{12} \times 10^{-6} \text{ F/m}^8 \times 10^{-5} \text{ J} \quad (1)$$

$$-40 \mu J \quad (5)$$

$$-50 \mu J \quad (4)$$


$$-60 \mu J \quad (3)$$

$$-10 \mu J \quad (2)$$

$$-5 \mu J \quad (1)$$

۵۴- مداری شامل القاگر $L=20\text{mH}$ ، خازن $C=2.0 \mu\text{F}$ و کلید S است(شکل زیر). ابتدا کلید قطع و بار خازن $C=20\mu\text{C}$ است. کلید را وصل می کنیم. در مدار جریانی متغیر با زمان پدید می آید که متناوأً خازن خالی و پر می کند. مدار در نتیجه‌ی این رخداد انرژی به صورت امواج الکترومغناطیسی به اطراف تابش می کند. با فرض این که انرژی تابش شده در اولین باری که خازن خالی و پر می شود ناچیز باشد، بیشینه‌ی جریان در بازه‌ی زمانی خالی و پر شدن خازن برای اولین بار پس از وصل شدن کلید چند آمپر است؟ (راهنمایی: $1\text{mH}=10^{-3}\text{H}$)

$$L=20\text{mH}$$



$$\text{ب) } 0/02$$


$$\text{الف) } 0/01$$

$$\text{د) } 0/10$$

$$\text{ج) } 0/05$$

$$\text{ه) } 0/20$$

۵۵- در فضای خالی بالای جیوه در لوله یک بارومتر (فشارسنج) مقداری هوا محبوس است، بارومتر فشار هوا را درست نشان نمی دهد. در حالتی که دمای هوا -23°C درجه سلسیوس است اختلاف سطح ستون جیوه در ظرف و لوله‌ی بارومتر 60 cm و طول ستون هوا محبوس در بالای لوله 40 cm است. در حالتی که دمای هوا $+27^\circ\text{C}$ درجه سلسیوس است اختلاف سطح ستون جیوه در ظرف و لوله‌ی بارومتر X سانتی متر و طول ستون هوا محبوس در بالای لوله 7 cm است. اگر فشار هوا در این حالت P سانتی متر جیوه باشد. کدام دسته معادلات مقادیر درست X و 7 و P را نشان می دهد؟ فشار هوا محیط 70 cmHg است.



$$Y+x=100 \quad (2)$$

$$Y-x=20 \quad (1)$$

$$Y+P=70$$

$$Y+P=Y$$

$$Xp=400$$

$$Xp=480$$

$$Y+x=100 \quad (4)$$

$$Y-x=20 \quad (3)$$

$$Y+P=Y$$

$$Y+P=70$$

$$Xp=480$$

$$Xp=400$$

$$Y-x=10 \quad (5)$$

$$Y+P=70$$

$$Xp=400$$

سوالات آزمون اولین المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران (بخش آمار)

۵۶- در یک فرآیند جهت کشت سلول های بنیادی مغز استخوان میزان مول افزوده شده ی آمینواسید ها جهت غنی کردن محیط کشت (داده های اولیه) دارای ضریب تغییرات 0.08 در داده های آماری می باشد. اگر آزمایشگری به هر داده آماری 5 مول (داده های ثانویه) بیافزاید مشاهده می کند که ضریب تغییرات حاصل 0.075 خواهد شد. میانگین مول داده های ثانویه برابر با کدام عدد می باشد؟

- (۱) ۸۰ (۲) ۷۵ (۳) ۶۴ (۴) ۶۰ (۵) ۵۶

۵۷- در یک آزمایش جداسازی سلول های بنیادی فردی در آزمایشات مختلف سلول ها را در 6 زمان مختلف در دستگاه سانتریفیوژ قرار می دهد که میانگین و دامنه تغییرات این زمان ها به ترتیب برابر با 15 و 5 می باشد. اگر فرض کنیم مقدار بدست آمده در زمان ها در نیمه بعد از میانه متوالی باشند مُد مربوط به زمان مورد آزمایش ساده که فراوانی آن 3 بوده است چه عددی می باشد؟(زمان ها به دقیقه ذکر شده و شامل اعداد طبیعی می باشند).


- (۱) ۱۶ (۲) ۱۵ (۳) ۱۴ (۴) ۱۳ (۵) ۱۲

۵۸- یک محقق هنگام بررسی کارآزمایی های بالینی انجام شده برای تزریق سلول های بنیادی مغز استخوان در نخاع بیماران مبتلا به قطع نخاع متوجه شد که از میان 5 مقاله منتشر شده میزان جمعیت سلولی تزریق در محل ضایع در 5 مقاله 10^6 سلول، در 5 مقاله دیگر $10^6 \times 2$ سلول، در سه مقاله $10^6 \times 3$ سلول، در 6 مقاله $10^6 \times 4$ سلول و در 3 مقاله دیگر $10^6 \times 6$ سلول بوده است. چند گزینه در مورد این داده ها می تواند صحیح باشد؟

- میانه داده ها با میانگین داده ها برابر است.
- مدل داده ها بزرگتر از میانگین داده ها می باشد.
- بهتر است محقق برای تصمیم گیری در انجام آزمایش بعدی به شاخص مدل اعتماد کند.
- میزان مدل داده ها دو برابر میانه داده ها می باشد.

- (۱) صفر مورد (۲) ۱ مورد (۳) ۲ مورد (۴) ۳ مورد (۵) ۴ مورد

۵۹- چند محقق به صورت دو به دو روش های مختلفی جهت کشت و پاساز دادن سلول ها ابداع کرده اند و سپس نمودار های مربوط به میزان زنده ماندن (viability) سلول ها پس از روش مربوط به خود را به شکل های زیر رسم نموده اند. به نظر شما در مورد کدام نمودار زیر می توان قضاوت صحیحی به عمل آورد و گمراه کننده نمی باشد؟



۵) هیچکدام

۴) فقط ج

۳) الف و ج

۲) الف، ب، ج

۱) الف و ب

۶۰- جراحی می خواهد تعداد پیوند موفق سلول های کراتینوسیت (لایه‌ی سطحی پوست) خود در یک گروه از بیماران سوختگی را با گروه دیگری مقایسه کند. در این رابطه بر اساس یک مقاله علمی تقریباً ۴۰ درصد پیوند ها عفونی شده ولی ۶۰ درصد پیوند ها زنده می مانند. احتمال اینکه از بین ۵ پیوند پوست حداکثر یک مورد دچار عفونت شود چقدر است؟

۰/۶۰(۵)

۰/۴۰(۴)

۰/۲۶(۳)

۰/۱۲(۲)

۰/۰۵۲(۱)

پایدار و پیروز باشید

لطفاً در این کادر چیزی ننویسید.




مطابق توضیحات دفترچه تکمیل شود.

کد دفترچه

طی سوالات اولین اهدیادانه افراد
سلول های سیادس و بیشتر مازهای -

کرد فرجه ←



غلط

صحیح

لطفاً گزینه را به صورت کامل و فقط با مداد مشکی نرم پر کنید.

۱	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۸	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۹	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۰	۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۲۱	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۲	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۳	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۴	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۵	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۶	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۷	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۸	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۹	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۰	۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۴۱	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۲	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۳	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۴	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۵	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۶	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۷	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۸	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۹	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۰	۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۶۱	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۲	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۳	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۴	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۵	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۶	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۷	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۸	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۹	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷۰	۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۱۱	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۲	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۳	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۴	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۵	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۶	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۷	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۸	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۹	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۰	۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۳۱	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۲	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۳	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۴	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۵	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۶	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۷	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۸	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۹	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۰	۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۵۱	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۲	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۳	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۴	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۵	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۶	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۷	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۸	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۹	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶۰	۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۷۱	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷۲	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷۳	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷۴	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷۵	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷۶	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷۷	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷۸	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۷۹	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۸۰	۱ ۲ ۳ ۴ ۵

محل امضاء

..... فرزند با کد ملی اینجانب

مطابقت اطلاعات مندرج در پاسخ برگ را با مشخصات خود تایید می نمایم.