

۱. در رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین به ترتیب کدام یک از بخش‌های یک سلول رنگ آمیزی می‌شود؟

الف - DNA-RNA

ب - هسته - RNA

پ - DNA - سیتوپلاسم

ت - RNA - هسته

ج - سیتوپلاسم - هسته

۲. کدامیک از گزاره‌های زیر درست‌تر است؟

الف - میزان رونوشت‌های RNA در یک سلول معمولاً بیشتر از میزان بیان پروتئین مربوطه است.

ب - میزان رونوشت‌های RNA در یک سلول معمولاً کمتر از میزان بیان پروتئین مربوطه است.

پ - میزان رونوشت‌های RNA در یک سلول معمولاً برابر با میزان بیان پروتئین مربوطه است.

ت - میزان رونوشت‌های RNA در یک سلول معمولاً رابطه مستقیمی با میزان بیان پروتئین مربوطه ندارد.

ج - میزان رونوشت‌های RNA در یک سلول معمولاً رابطه مستقیمی با میزان بیان پروتئین مربوطه دارد.

۳. چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

سلول‌های بنیادی موجود در مغز استخوان، منشأ ایجاد سلول‌های خونی هستند. با بررسی تقسیم این سلول‌ها در یک فرد سالم، با دو پروتئین pro-A₁ و pro-A₂ مواجه شدیم. عملکرد پروتئین pro-A₁ اختلال در تقسیم سلولی با متوقف کردن چرخه تقسیم سلولی است. اما pro-A₂ با عبور دادن سلول از نقاط وارسی سبب تحریک تقسیم سلولی می‌شود. با توجه به عملکرد پروتئین‌های مذکور می‌توان گفت...

a. افزایش عملکرد پروتئازها بر پروتئین pro-A₁ می‌توان انتظار بروز یرقان در فرد را داشت.

b. با افزایش بیان پروتئین pro-A₁ احتمال بروز علائمی نظیر بیماری ایدز در فرد افزایش می‌یابد.

c. با مهار دائمی پروتئین مهارکننده رونویسی از ژن سازنده pro-A₂ احتمال افزایش هماتوکریت وجود دارد.

d. با افزایش فعالیت pro-A₁ احتمال عدم توقف خونریزی به دنبال جراحت‌ها افزایش می‌یابد.

الف - هیچ کدام صحیح نیست.

ب - ۱ مورد

پ - ۲ مورد


ت - ۳ مورد

ج - ۴ مورد

۴. چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

شکل زیر بررسی یک مسیر متابولیکی درون سلولی را نشان می‌دهد. پروتئین pro14 با تحریک بیان ژن پروتئین‌های سازنده ATP در سلول نقش خود را به انجام می‌رساند. پروتئاز A (Protease A) برای رونویسی به حضور ویتامین A نیازمند است. با توجه به مسیر متابولیکی رسم شده در صورتی که جای علامت سوال قرار گیرد، در نتیجه

- الف- فلش - کاهش فعالیت کبد می‌تواند علائمی مانند بیماری لبر نمایان کند.
 - ب- خط قطع شده - افزایش فعالیت پروتئین proB12 می‌تواند منجر به کاهش سطح گلوکز خون فرد شود.
 - ج- فلش - با مهار ساخت پروتئین proM1، انقباض ماهیچه‌های اسکلتی با مشکل روبه رو خواهد شد.
 - د- خط قطع شده - با کاهش عملکرد پروتئین proZ، عملکرد پمپ‌های سدیم پتاسیم به سختی انجام خواهد شد.
- توجه: فلش (↓) به معنی تحریک و خط قطع شده (—) به معنی مهار مسیر متابولیکی است.



الف- هیچ کدام از موارد صحیح نیست.

- ب- ۱ مورد صحیح است.
- پ- ۲ مورد صحیح است.
- ت- ۳ مورد صحیح است.
- ج- ۴ مورد صحیح است.

۵. قرنیه، لایه‌ای شفاف از جنس بافت همبند متراکم بر روی سیاهی چشم است و یکی از دو لنز چشم را تشکیل می‌دهد و در ساختار خود، کلاژن و سلول‌هایی مانند فیبروبلاست دارد. در سمت خارج، لایه بافت پوششی سنگفرشی چند لایه و غیر کراتینیزه دارد که توسط لایه اشکی پوشیده شده است. در سمت داخل، لایه بافت پوششی مانند اندوتلیوم رگ آن را مفروش کرده است. وقتی لایه داخلی (اندوتلیوم) بیمار می‌شود (از تعداد سلول‌های سالم و فعل کاسته می‌شود)، قرنیه ورم می‌کند (آب میان بافتی در آن تجمع می‌کند) و از شفافیت آن کاسته می‌شود و دید کاهش می‌یابد. به نظر شما کدام گزاره درباره این بیماری درست است؟

الف- می‌توان پیش‌بینی کرد که دید این افراد اول صبح و پس از بیداری از خواب بهتر است و با در طول روز بدتر می‌شود.

ب- با ریختن قطره غلیظ از محلول نمکی (NaCl) روی سطح چشم، دید این افراد بدتر می‌شود.

پ- دلیل ورم کردن قرنیه این است که پمپ سدیم-پتاسیم (Na^+/K^+ -ATPase) نمی‌تواند به مقدار کافی سه یون سدیم را از سمت زلایه (مایع داخل اتاق قدامی چشم) در ازای دو پتاسیم از قرنیه جابه‌جا کند.

ت- اشکال در غشای پایه موجب تراوش بیشتر زلایه به درون قرنیه می‌شود.

ج- احتمالاً لایه اندوتلیوم، ظرفیت بازساختی (تکثیر) نداشته باشد و شاید بتوان با تزریق سوسپانسیون سلول اندوتلیال، این بیماری را درمان کرد.

۶. وجود کدام یک از پیوندهای گروه‌های عاملی زیر در ساختار داربست تخریب‌پذیر پلیمری حاوی سلول برای پیوند به بدن مناسب است؟

الف- (-NH-CO-)

ب- (-COO-)

پ- (-CH₂-CH₂-)

ت- (-CH₂-O-)

ج- حلقه بنزئی

۷. افزایش کلسیم خارج سلولی باعث بهبود رشد و تحریک سلول‌های عضله قلبی می‌شود. با فرض اینکه محیط کشت سلول‌های عضله قلبی IMDM است که دارای ۱۶۵۳٪ گرم در لیتر CaCl_2 است، حدوداً چه میزان CaCl_2 اضافی باید به ۵۰ میلی لیتر محیط کشت اضافه شود، تا غلظت نهایی کلسیم در محیط

۲ میلی مولار باشد؟

الف- ۲/۸ میلی گرم

ب- ۵۵ میلی گرم

پ- ۲۲۲ میلی گرم

ت- ۱۱ میلی گرم

ج- ۸/۳ میلی گرم

۸. فرض کنید فشار و سرعت جریان خون درون رگ آئورت، به ترتیب 10^4 Pa و $1,4 \text{ m/s}$ است. اگر قطر داخلی رگ آئورت در قسمتی از آن به علت تجمع پلاکهای چربی 30% درصد کاهش یافته باشد، سرعت جریان خون در محل گرفته شده را حساب کنید. خون را به عنوان یک مایع تراکم ناپذیر با چگالی $1,06 \text{ kg/m}^3$ در نظر بگیرید. قطر داخلی رگ آئورت به صورت طبیعی در قسمت شکمی بین 2 تا 3 سانتی متر است.

- الف- $1,28 \text{ m/s}$
- ب- $0,82 \text{ m/s}$
- پ- $0,28 \text{ m/s}$
- ت- $0,58 \text{ m/s}$
- ج- $0,18 \text{ m/s}$

۹. غشای سلول همانند یک خازن تخت است و باعث جدایی بار و اختلاف پتانسیل بین فضای داخلی و خارجی سلول می‌شود. در واقع ساختار فسفولیپیدها و آرایش دو لایه آنها این شباهت را ایجاد می‌کند. در غشای دولایه سرهای قطبی فسفولیپیدها همانند صفحات رسانای خازن و دمهای هیدروکربنی همانند بخش دی الکتریک عمل می‌کنند. با توجه ویژگی‌هایی که از یک خازن سراغ دارد کدام یک از گزینه‌های زیر سبب افزایش پتانسیل آرامش یک سلول نورونی می‌شود.

- الف- کاهش تعداد کانال‌های نشتی پتانسیم
- ب- افزایش سطح سلول از طریق افزایش تعداد فسفولیپیدهای غشا
- پ- استفاده از دارویی که (Na^+/K^+) -ATPase را مهار کند.
- ت- کاهش سطح سلول از طریق کاهش تعداد فسفولیپیدهای غشا
- ج- افزایش تعداد کانال‌های دریچه‌دار سدیم

۱۰. کدام یک از موارد زیر سبب افزایش پدیده ترشوندگی (Wettability) خواهد شد؟

- الف- بسته شدن روزنه‌های برگ در نور زیاد
- ب- استفاده از آلkan‌های با بیش از 20 اتم برای پوشش میوه
- پ- استفاده از آب داغ در زمان شستشو
- ت- افزایش طول زنجیره هیدروکربنی الكل شرکت کننده در سنتر یک پلی استر
- ج- پوشش سطح دیوار با مواد ناتراوا

۱۱. فرض کنید گونه خاصی از یک عنکبوت بکرزا وجود دارد که پس از تولد می‌تواند هر هفت روز حداکثر n

فرزنده باشد. جمعیت این گونه هر هفته حداکثر چند برابر می‌شود؟

الف - n

ب - $n+1$

پ - 2^n

ت - 2^{n+1}

ج - اطلاعات سوال کافی نیست.

۱۲. فرض کنید گونه خاصی از یک حشره خودلقاح پس از تولد، هر هفت روز دقیقاً n فرزند به دنیا بیاورد. اگر

جمعیت اولیه این حشره برابر با p باشد و طی یک ماه مرگ و میری صورت نگیرد، تعداد فرزندان تازه

متولد در هفته سوم چند خواهد بود؟

الف - $p(n+1)^3$

ب - $p(n+1)^3$

پ - $np(n+1)^3$

ت - $np(n+1)^3$

ج - n

۱۳. می‌دانیم که در برخی موارد پروتئین‌ها با اتصال به یکدیگر واحدهای بزرگتری به نام کمپلکس‌های

پروتئینی ایجاد می‌کنند. فرض کنید یک محقق ۱۲ پروتئین شامل ۵ پروتئین نوع یک، ۳ پروتئین نوع دو

و ۴ پروتئین نوع سه را از سلول یک شخص جداسازی کرده و علاقه مند به بررسی و آزمایش کمپلکس

هایی با اندازه ۴ پروتئین باشد. اگر بدانیم که پروتئین‌های نوع دو و نوع سه تنها به شرطی می‌توانند در یک

کمپلکس حضور داشته باشند که دقیقاً یک پروتئین از نوع یک در کمپلکس وجود داشته باشد، این محقق

چند کمپلکس متفاوت را می‌تواند بررسی نماید.

(توجه نمایید که ترتیب پروتئین‌ها در تشکیل کمپلکس اهمیتی ندارد و هر n پروتئین فقط یک کمپلکس

تشکیل می‌دهند.)

الف - ۲۲۱

ب - ۴۰۱

پ - ۳۵۰

ت - ۳۵۱

ج - ۳۴۱

۱۴. توالی ژنوم انسان، متشکل از ۲۳ جفت کروموزوم، در مجموع طولی در حدود ۳ میلیارد نوکلئوتید دارد. فرض کنید توالی ژنوم انسان یک توالی DNA کاملاً تصادفی (متشکل از نسبت‌های مساوی A و T و C و G) است. یک زیست‌شناس، نوعی آنزیم نوکلئاز کشف کرده است که وقتی در مجاورت یک قطعه DNA حاوی توالی $^{3'}\text{-} \text{AAAACCGGTTTT}\text{-}^{5'}$ قرار می‌گیرد این توالی را از وسط (هم در رشته اصلی و هم در رشته مکمل) برش می‌زند. اگر برای برش و قطعه قطعه کردن ژنوم انسان از این آنزیم استفاده کنیم، تعداد قطعاتی که ایجاد می‌شود به کدامیک از اعداد زیر نزدیک‌تر است؟

- الف- بین ۱۵۰ تا ۲۵۰
- ب- بین ۲۵۰ تا ۳۵۰
- پ- بین ۵۰ تا ۱۵۰
- ت- بین ۳۵۰ تا ۴۵۰
- ج- هیچ کدام

۱۵. در بررسی تقسیم سلولی در یک گونه جانوری، پژوهشگری با سه پروتئین مهم مواجه شد که در تنظیم فرآیند تقسیم نقش داشتند. فرض کنید این سه پروتئین X و Y و Z نام دارند. این پژوهشگر، با استفاده از یک تکنیک جدید، سطح بیان پروتئین‌های ساخته شده از روی این ژن‌ها را برای ده سلول مجزا بدست آورد، که داده‌های مربوط به هر یک از سلول‌ها در جدول زیر نمایش داده شده است.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
X بیان	۰,۰۲	۰,۹۸	۰,۹۹	۰,۹۵	۰,۸۷	۰,۹۰	۰,۰۲	۰,۰۱	۰,۹۷	۰,۰۱
Y بیان	۰,۹۸	۰,۰۱	۰,۰۳	۰,۰۲	۰,۰۱	۰,۹۰	۰,۹۲	۰,۹۳	۰,۹۰	۰,۹۶
Z بیان	۰,۹۲	۰,۸۶	۰,۹۱	۰,۹۷	۰,۰۳	۰,۰۴	۰,۹۵	۰,۹۸	۰,۰۳	۰,۹۱

کدامیک از گزاره‌های زیر در مورد نحوه ارتباط X و Y و Z در فرایند تنظیم تقسیم سلولی با داده‌های بالا گزینه محتمل‌تری به نظر می‌رسد.

- الف- هر یک از دو پروتئین Y و Z می‌توانند به عنوان مهارکننده بیان X عمل کنند.
- ب- هر یک از دو پروتئین X و Y می‌توانند به عنوان مهارکننده بیان Z عمل کنند.
- پ- X مهارکننده بیان Y و Z است.
- ت- برای مهار بیان Y باید همزمان بیان X و Z زیاد باشد.
- ج- Y و Z به همراه یکدیگر بیان X را مهار می‌کنند.

۱۶. در یک نمونه میزان بیان ژن g_1 برابر ۱۰ و میزان بیان ژن g_2 برابر ۵۰ است. اگر انحراف معیار بیان ژن‌های g_1 ، g_5 ، g_4 و g_3 برابر صفر باشد، میانگین بیان ژن‌های g_2 ، g_5 و g_4 چند خواهد بود؟

- الف- ۰
- ب- ۱۰
- پ- ۱۲
- ت- ۱۲,۵
- ج- ۲۰

۱۷. در یک آزمایشگاه در تشخیص بیماری یک فرد بیمار، آزمایش خون با احتمال ۹۵ درصد با موفقیت انجام می‌شود. همچنین این آزمایشگاه یک درصد از افراد سالم را نیز به اشتباه بیمار تشخیص می‌دهد. فرض کنید نیم درصد این جامعه واقعاً مبتلا به بیماری باشند. در این صورت اگر نتیجه آزمایش فردی مشبت باشد چقدر احتمال دارد این فرد بیمار باشد.

$$\begin{array}{r}
 95 \\
 \hline
 294 \\
 95 \\
 \hline
 295 \\
 95 \\
 \hline
 100 \\
 95 \\
 \hline
 2000 \\
 95 \\
 \hline
 20000
 \end{array}$$

۱۸. فرض کنید احتمال زنده ماندن و تقسیم یک گونه باکتری در صورت داشتن ژن X برابر ۱۰ درصد و در صورت نداشتن ژن X برابر ۱۰۰ درصد باشد. در صورتیکه دریک جمعیت از این باکتری ۵۰ درصد آنها حاوی ژن X باشند پس از دو مرحله تقسیم سلولی کدامیک از عبارت‌های زیر درست است.

- الف- جمعیت باکتری‌های حاوی ژن X، $\frac{2}{202}$ جمعیت کل خواهد بود.
- ب- جمعیت باکتری‌های حاوی ژن X، $\frac{10}{110}$ جمعیت کل خواهد بود.
- پ- جمعیت باکتری‌های حاوی ژن X، $\frac{5}{100}$ جمعیت کل خواهد بود.
- ت- جمعیت باکتری‌های حاوی ژن X، $\frac{5}{1000}$ جمعیت کل خواهد بود.
- ج- هریک چهار گزینه بالا امکان پذیر است.

۱۹. کنام (Niche) سلول‌های بنیادی چیست؟

- الف- به موضعی در بافت که محل زندگی سلول بنیادی است، کنام می‌گویند.
- ب- به پیام‌هایی که سلول بنیادی از اعصاب و عروق خونی اطراف خود دریافت می‌دارد، کنام می‌گویند.
- پ- به مجموعه عوامل بیرونی که به نوعی رفتار سلول بنیادی را متأثر می‌کنند، کنام می‌گویند.
- ت- به ماده زمینه‌ای خارج سلولی که سلول بنیادی روی آن مستقر می‌شود، کنام می‌گویند.
- ج- به بخشی از بافت که سلول‌های بنیادی «فعال نشده» در آن مستقر هستند، کنام می‌گویند.

۲۰. محققان در درمان بیماری‌ها از دو نوع سلول بنیادی، سلول بنیادی پرتوان و سلول بنیادی بزرگسال، بهره می‌برند. در رابطه با تفاوت این دو نوع سلول و دلیل مزیت هر کدام به دیگری، کدام گزینه صحیح نیست؟
- الف- سلول‌های بنیادی پرتوان می‌توانند به همه انواع سلول‌های موجود در بدن تبدیل شوند ولی سلول‌های بنیادی بزرگسال دارای تمایز به انواع محدودی از سلول‌ها هستند.
- ب- در استفاده از سلول‌های بنیادی بزرگسال خود فرد بیمار، امکان رد پیوند به حداقل می‌رسد.
- پ- توان تکثیر سلول‌های بنیادی بزرگسال محدود است و تولید حجم انبوه از این سلول‌ها با چالش رو به روز است.
- ت- سلول‌های بنیادی بزرگسال نسبت به سلول‌های بنیادی پرتوان تمایزیافته با تکثیر محدود محسوب می‌شوند و احتمال تمایز ناخواسته آن‌ها به نوع دیگری از سلول‌ها و تومورزایی کمتر است.
- ج- جداسازی و استفاده از سلول‌های بنیادی بزرگسال با مشکلات اخلاقی همراه است.

۲۱. کدام یک از مواد زیر مانع تشکیل کریستال‌های یخ در سلول می‌شوند؟
- الف- Glycerol و Dimethyl sulfoxide (DMSO)
- ب- Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) و Dimethyl sulfoxide (DMSO)
- پ- Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM) و Fetal bovine serum (FBS)
- ت- Fetal bovine serum (FBS) و Dimethyl sulfoxide (DMSO)
- ج- Dimethyl sulfoxide (DMSO) و Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM)

۲۲. چسبیدن سلول‌ها به کف ظرف کشت به چه عواملی بستگی دارد؟
- الف- نیروهای الکترواستاتیک و واندروالسی
- ب- پروتئین‌های چسبنده مانند لامینین و فیبرونکتین
- پ- وجود یون دو ظرفیتی کلسیم
- ت- سیالیت غشای سلول
- ج- گزینه‌های الف، ب و پ

۲۳. کدامیک از عبارات زیر در مورد سلول‌های بنیادی مزانشیمی صحیح است؟
- الف- سلول‌های بنیادی مزانشیمی همه‌توان هستند.
- ب- در محیط خارج از بدن تمایز نمی‌یابند.
- پ- مورفولوژی دوکی شکل دارند.
- ت- در محیط داخل بدن تمایز نمی‌یابند.
- ج- به انواع دودمان‌های بافت همبند، به جز آدیپوسیت، تمایز می‌یابند.

۲۴. کدامیک به عنوان منبع رایج استخراج سلول‌های بنیادی شناخته نمی‌شود؟

- الف- سیستم عصبی مرکزی
- ب- سیستم عضلانی - اسکلتی
- پ- بافت چربی
- ت- مغز استخوان
- ج- بند ناف

۲۵. رفتارهای مختلفی که سلول‌های بنیادی متفاوت مستقر در انواع بافت‌ها دارند، ناشی از چیست؟

- الف- بخارطهای خاصی توسط این سلول‌ها و همچنین تأثیر سیگنال‌های بیرون از سلول است.
- ب- بخارطهای سیگنال‌های متفاوتی است که به سلول‌های بنیادی دستورات متفاوت می‌دهند.
- پ- بخارطهای مجموعه‌های متفاوتی از ژن‌ها توسط سلول‌های بنیادی مختلف است.
- ت- به دلیل ریخت‌شناسی متفاوت آن‌ها با یکدیگر و تأثیر سلول‌های همسایه است.
- ج- به خاطر سیگنال‌های رسیده از سلول‌های همسایه و سایر سیگنال‌های بیرون سلول است.

۲۶. اگر سلول‌های بنیادی مزانشیمی در یک هیدروژل با اندازه حفرات میانگین ۱۰ نانومتر محصور شده باشند،

در چه صورت امکان مهاجرت سلول‌ها درون هیدروژل فراهم می‌شود؟

- الف- عدم چسبندگی سلول به هیدروژل
- ب- تخریب پذیری هیدروژل
- پ- تمایز سلول‌های مزانشیمی به سلول‌های اپیتلیالی
- ت- تفاوت غلظت عوامل تکثیر سلول در نقاط مختلف هیدروژل
- ج- گذشت زمان و تکثیر سلول‌ها

۲۷. بررسی مراحل چرخه سلولی در کدام یک از موارد زیر ممکن است تفاوتی را نشان ندهد؟

- الف- تمایز سلول‌های بنیادی
- ب- استفاده از یک داروی جدید برای کاهش متاستاز سلول بنیادی سرطانی
- پ- تغییرات درصد سرم محیط کشت
- ت- استفاده از فاکتور رشد در محیط کشت
- ج- سلول‌های عضله قلبی قبل و بعد از کشت

۲۸. در صورت تزریق سلول‌های بنیادی بافت چربی در ورید بصورت آلوژنیک (allogeneic) کدامیک می‌تواند از نتایج این تزریق باشد؟

- a. رد پیوند در اثر واکنش‌های ایمنی
 - b. ایجاد تومورهای بدخیم سلطانی
 - c. تجمع سلول‌ها در ریه
 - d. افزایش فشار خون بدلیل حضور سلول‌ها
 - e. حضور سلول‌ها در بافت‌های غیر از بافت هدف
- الف- فقط a
ب- e و c
پ- d و b
ت- b و a
ج- e و b

۲۹. کدام شیوه سلول درمانی زیر برای درمان بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) می‌تواند مناسب‌تر باشد؟

- a. تزریق زنوژنیک (xenogeneic) سلول‌های بنیادی مغز استخوان میمون
 - b. تزریق اتولوگ (autologous) سلول‌های شوان
 - c. تزریق آلوژنیک (allogeneic) سلول‌های بنیادی مغز استخوان
 - d. تزریق آلوژنیک (allogeneic) سلول‌های شوان
 - e. تزریق اتولوگ (autologous) سلول‌های بنیادی بافت چربی
- الف- فقط a
ب- d و c
پ- d و b
ت- e و b
ج- e و c

۳۰. برای تبدیل مطالعات تحقیقاتی به بالینی، بهتر است استفاده از ترکیبات غیرانسانی به حداقل رسد. بنابراین، برای شروع یک کار بالینی، امکان استفاده از سرم گاوی برای محیط کشت سلول‌ها وجود ندارد و به عنوان جایگزین قرار است که از سرم انسانی استفاده شود. به نظر شما استفاده از کدام گروه خونی برای کشت سلول‌های انسانی مناسب است؟

- الف- O منفی
ب- O مثبت
پ- AB منفی
ت- AB مثبت
- ج- نوع گروه خونی تأثیری در کشت سلول ندارد.

۳۱. کدام گزاره در مورد سلول‌های بنیادی و کاربرد آن‌ها صحیح است؟

- الف- اگر در سلول درمانی از سلول‌های بنیادی بزرگسال خود فرد استفاده شود، درمان بی خطر خواهد بود.
- ب- هنوز نتایجی مبنی بر اثربخشی سلول درمانی بیماری‌ها با سلول‌های بنیادی وجود ندارد.
- پ- یکی از ویژگی‌های سلول‌های بنیادی نامیرایی است.
- ت- سلول‌های بنیادی بزرگسال تنها از بافت کودکان قابل جداسازی است.
- ج- امروزه، امکان تبدیل انواع مختلف سلول‌های تمایزیافته به سلول‌های بنیادی پرتوان وجود دارد.

۳۲. کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

- الف- همه پلیمرهای طبیعی می‌توانند در بدن تخریب شوند.
- ب- سلول‌ها می‌توانند به همه پلیمرهای طبیعی بچسبند.
- پ- پلیمرهای مصنوعی نمی‌توانند در بدن تخریب شوند.
- ت- جذب پروتئین‌ها به سطح یک ماده باعث چسبندگی سلول‌ها به آن می‌شود.
- ج- چسبندگی سلول‌ها به سطح یک ماده مانع از تکثیر آنها می‌شود.


۳۳. اتیلن دی آمین تراستیک اسید (EDTA) یک ترکیب شیمیایی است که می‌تواند با یون کلسیم وارد یک برهمنکنش فیزیکی قوی شود. اگر بخواهیم با جداسازی سلول‌ها از بافت به یک داریست طبیعی برای مهندسی بافت دست پیدا کنیم، EDTA در کدام یک از فرایندهای زیر مؤثر است؟

- الف- گسیست اتصالات سلول- سلول
- ب- گسیست اتصالات سلول- ماتریس
- پ- گسیست غشاء سلول
- ت- گسیست اتصالات پروتئین‌های ساختاری
- ج- گسیست رشته‌های DNA

۳۴. سلولی از توده سلولی داخلی (Inner cell mass) بلاستوسیست استخراج شده است. کدام یک از موارد زیر از خصوصیات این سلول نیست؟

- الف- Totipotent
- ب- Telomerase activity
- پ- Self-renewal
- ت- Differentiation
- ج- Proliferation

۳۵. با توجه به تصویر روبرو کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟



- الف- سلول p_1 : d_1 و d_2 است و سلول P_2 یک سلول biopotential است.
- ب- سلول p_2 : d_1 است و سلول P_1 ، یک سلول unipotential است.
- پ- سلول p_1 : d_1 است و سلول P_2 ، یک سلول unipotential است.
- ت- سلول p_1 : d_1 و d_2 است و سلول P_2 ، یک سلول unipotential است.
- ج- سلول p_2 : d_1 است و سلول P_2 یک سلول biopotential است.

۳۶. ایجاد انقباضات قلبی به دلیل وجود ساختارهای منظم و پیچیده پروتئینی در داخل سلول‌های عضله قلبی است که توسط شبکه پیچیده بیان ژن کنترل می‌شود. یکی از پروتئین‌های درگیر در ایجاد این ساختارهای داخل سلولی، تروپونین قلبی است که در سلول‌های عضله قلبی بیان می‌شود ولی در سلول‌های بافت‌های دیگر، مانند سلول‌های فیبروبلاست پوست بیان ندارد. به نظر شما، کدام گزاره در مورد تبدیل سلول‌های فیبروبلاست به سلول‌های تپنده قلبی صحیح نیست؟

- الف- می‌توان با وارد کردن ژن‌های بالادست ژن‌های ساختاری قلبی، مانند ژن‌های فاکتورهای رونویسی توسط وکتور مناسب به فیبروبلاست‌ها و بیان آن‌ها، به تبدیل سلول‌های فیبروبلاست به سلول‌های تپنده قلبی کمک کرد.
- ب- می‌توان فیبروبلاست‌ها را با محیط کشت حاوی مواد تأثیرگذار بر مسیرهای سیگنالی داخل سلول مانند فاکتورهای رشد و سایتوکین‌ها، به نفع تمایز به سلول‌های عضله قلبی، تیمار کرد.
- پ- می‌توان الگوی بیان ژنی در سلول‌های عضله قلبی و سلول فیبروبلاست بررسی و مقایسه شود تا ژن‌های دارای نفاوت بیان در این دو نوع سلول مشخص شود. سپس از افزایش بیان و یا کاهش بیان این ژن‌ها برای تبدیل فیبروبلاست‌ها به سلول‌های عضله قلبی استفاده شود.
- ت- می‌توان از مواد تغییردهنده وضعیت کروماتین مانند دمتیله کننده‌ها استفاده شود تا ژن‌های خاموش نیز امکان روشن شدن پیدا کنند.
- ج- می‌توان با پیوند سلول‌های فیبروبلاست به قلب آنها را به سلول‌های عضله قلبی تبدیل کرد.

۳۷. کدامیک از موارد زیر جزو نقش‌های کنام سلول‌های بنیادی نیست؟

- الف- کمک به تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی در دوران جنینی
- ب- فعال کردن سلول بنیادی در آسیب بافتی
- پ- زمینه سازی تقسیم نامتقارن سلول‌های بنیادی
- ت- جلوگیری از تمایز زودرس سلول‌های بنیادی
- ج- ارائه اطلاعات توپوگرافیک برای تغییر محل و مهاجرت سلول بنیادی

۳۸. کدامیک از موارد زیر جزو اهداف استفاده از داربست‌های مهندسی بافت نمی‌تواند باشد؟

- الف- فراهم آوردن بستر مناسب برای کاشتن سلول
- ب- تقلید محیط سه بعدی ماتریکس خارج سلولی ارگان هدف
- پ- بهبود چسبندگی و تمایز سلولی
- ت- فراهم آوردن یک حمایت ساختاری دائمی ماندگار
- ج- افزایش نسبت سطح به حجم

۳۹. نتیجه تدوین یک مدل کسب و کار (Business Model) در ساخت پروژه‌های زیرساختی چیست؟

- الف- دستیابی به برنامه‌ریزی استراتژیک مناسب با چشم‌انداز توسعه شرکت
- ب- دستیابی به اهداف و برنامه‌های عملیاتی - تجاری برای راهاندازی و اجرای بهتر پروژه‌های زیرساختی
- پ- دستیابی به منطق خلق، ارائه و کسب ارزش برای اجرای بهتر پروژه‌ها
- ت- دستیابی به استراتژی اقیانوس آبی برای تدوین برنامه جامع عملیاتی (master plan)
- ج- دستیابی به استراتژی تمایز در بازار جهت مواجهه بهتر با رقبا در بازارهای داخلی و خارجی

۴۰. نتیجه ارزش‌های پیشنهادی به مشتریان در شرکت‌های تولید داروهای نوترکیب چیست؟

- الف- دستیابی به منابع کلیدی و جذب نخبگان علمی
- ب- دستیابی به رضایت مشتریان
- پ- جریان‌های درآمدی
- ت- موارد الف و ب
- ج- موارد الف ، ب و پ

لطفاً در این کادر چیزی تنوییسید.

مرحله اول المیادها ۹۷-۹۸

مطابق توضیحات دفترچه تکمیل شود.

کد دفترچه

کرد

مدد تایید می‌شود

۹۷/۱۰

ماه

سلول های بنیادی

غلط

صحیح

لطفاً گزینه را به صورت کامل و فقط با مداد مشکی نرم پر کنید.

۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۹	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰

۲۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۳	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۴	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۵	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۶	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۹	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰

۴۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴۳	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴۴	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴۵	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴۶	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴۹	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰

۶۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶۳	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶۴	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶۵	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶۶	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶۹	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰

۱۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۳	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۴	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۵	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۶	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۹	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰

۳۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳۳	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳۴	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳۵	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳۶	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۳۹	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۴۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰

۵۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵۳	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵۴	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵۵	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵۶	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۵۹	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۶۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰

۷۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷۳	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷۴	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷۵	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷۶	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۷۹	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۸۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰

محل امضاء

..... فرزند با کد ملی اینجانب

مطابقت اطلاعات مندرج در پاسخ برگ را با مشخصات خود تایید می نمایم.