



۱. کدام یک از علایم زیر نشانگر هم‌مکان (ایزوتوپ) دیگر  ${}^A_Z E$  است؟

$${}^{A-Z}_Z E \quad (4)$$

$${}^{A+1}_{Z+1} E \quad (3)$$

$${}^A_{Z+1} E \quad (2)$$

$${}^{A+1}_Z E \quad (1)$$

۲. عنصر با آرایش الکترونی  $np^5$  با هیدروژن یک ترکیب شیمیایی تشکیل می‌دهد. حلالیت این ترکیب در آب چگونه و از چه خاصیتی برخوردار است؟


(۴) محلول، اسیدی

(۳) محلول، قلیایی

(۲) نامحلول، خنثی

(۱) محلول، خنثی

۳. شکل زیر پنج ابرازی یونش متوالی یک عنصر را نشان می‌دهد، این عنصر کدام است؟



(۴) کلسیم

(۳) بور

(۲) آلومینیم

(۱) کربن

۴. کدام مجموعه از اعداد کوانتومی برای تخصیص به یک الکترون درست نیست؟

$$n=1, l=0, m_l=0 \quad (2)$$

$$n=2, l=2, m_l=0 \quad (1)$$

$$n=2, l=1, m_l=+1 \quad (4)$$

$$n=2, l=1, m_l=0 \quad (3)$$



۵. در صورتی که B دارای دو ایزوتوپ ( $^{10}\text{B}$  و  $^{11}\text{B}$ ) باشد و Cl هم دو ایزوتوپ ( $^{35}\text{Cl}$  و  $^{37}\text{Cl}$ ) داشته باشد، ترکیب  $\text{BCl}_3$  چند جرم مولکولی دارد؟

۸ (۴)

۶ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۶. اتمی پس از جدا کردن ۶ الکترون از لایه‌های ظرفیتش به زیرلایه  $3p^6$  خود می‌رسد. آرایش الکترونی آخرین زیرلایه اتم خنثی کدام است؟

 $3d^6$  (۴) $3d^5$  (۳) $4s^1$  (۲) $4p^4$  (۱)

۷. با استفاده از دستگاه طیف‌سنج جرمی، نسبت جرمی  $^{13}\text{C}$  به  $^{12}\text{C}$   $1/0.836129$  برابر است. با توجه به اینکه درصد فراوانی  $^{12}\text{C}$   $98.89\%$  است، جرم اتمی میانگین کربن چند amu است؟

۱۲/۲۰ (۴)

۱۲/۰۱ (۳)

۱۲/۱۵ (۲)

۱۲/۰۹ (۱)

۸. کدام مخلوط برای استفاده به عنوان منبع نیتروژن، فسفر و پتاسیم مناسب است؟

 $\text{KCl}$  ،  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  ،  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  (۱) $\text{AgNO}_3$  ،  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  ،  $\text{K}_3\text{CO}_3$  (۲) $\text{KCl}$  ،  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  ،  $\text{NaNO}_3$  (۳) $\text{Na}_3\text{PO}_4$  ،  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  ،  $\text{KNO}_3$  (۴)

۹. در کدام گزینه نام هر دو ترکیب شیمیایی درست است؟




(۱) نیتروژن تری‌فلورید  $\text{NF}_3$ ، آلومینیم تری‌کلرید  $\text{AlCl}_3$ (۲) آهن(III) تری‌اکسید  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ، کروم(II) سولفید  $\text{CrS}$ (۳) کلسیم سیانید  $\text{Ca}(\text{CN})_2$ ، گوگرد(VI) تری‌اکسید  $\text{SO}_3$ (۴) آمونیم هیدروژن کربنات  $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ ، تتراکلرو متان  $\text{CCl}_4$







۱۰. کدام اکسید برای جذب  $\text{CO}_2$  تولیدشده در نیروگاهها و مراکز صنعتی مناسب است؟








۱۱. در کدام گزینه شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی همه گونه‌ها یکسان است؟



۱۲. ترتیب افزایش شعاع یونی در یون‌های  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$  و  $\text{Al}^{3+}$  (از راست به چپ) کدام است؟




۱۳. کدام انتقال نشری، فوتونی با بیشترین طول موج را دارد؟





۱۴. ترکیب حلقوی A ایزومر ساختاری ترکیب B است. ترکیب A به کدام خانواده از ترکیبات آلی تعلق دارد؟



(۴) اتر

(۳) آلدهید

(۲) کربوکسیلیک اسید

(۱) کتون

۱۵. در ترکیب آромاتیک A با فرمول بسته  $\text{C}_8\text{H}_9\text{Br}$ ، وقتی یکی از هیدروژن‌های گروه متیل در شرایط مناسب با Br جایگزین می‌شود، دو محصول با فرمول بسته  $\text{C}_8\text{H}_8\text{Br}_2$  به دست می‌آید که ایزومر ساختاری یکدیگرند. چند ساختار برای A می‌توان رسم کرد؟






۵ (۴)

۳ (۳)

۴ (۲)

۲ (۱)

۱۶. در آزمایشگاهی مواد زیر موجود است:



می‌خواهیم پلیمرهایی تهیه کنیم که در ساختار آن‌ها یک نوع مونومر، یا دو نوع مونومر با نسبت مولی برابر وجود داشته باشد. با استفاده از مواد موجود در آزمایشگاه در شرایط مناسب، امکان تهیه چند نوع پلی‌آمید با ویژگی بالا وجود دارد؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۴ (۲)

۱ (۱)

۱۷. ترکیب غیرحلقوی A با فرمول بسته  $\text{C}_5\text{H}_7\text{N}$  گروه عاملی نیتریل دارد. چند ساختار برای آن می‌توان رسم کرد؟

۵ (۴)


۶ (۳)

۷ (۲)

(۱) بیشتر از ۷




۱۸. نام‌گذاری درست برای ساختار زیر کدام گزینه است؟



- (۱) ۴-برمو-۳-متیل بوتیل-۵-متیل-۵-هیپتن  
 (۲) ۶-برمو-۵-اتیل-۷،۲-دیمتیل-۷-نون  
 (۳) ۴-برمو-۳-متیل بوتیل-۳-هیپتن  
 (۴) ۴-برمو-۵-اتیل-۳،۸-دیمتیل-۲-نون

۱۹. در شکل زیر چند ترکیب با خواص فیزیکی متفاوت وجود دارد؟



۲۰. در واکنش کلردار شدن زیر احتمال تشکیل چند ایزومر ساختاری وجود دارد؟ (اسکلت کربنی در این واکنش تغییری نمی‌کند).



- ۷ (۴)                  ۶ (۳)                  ۵ (۲)                  ۸ (۱)



۲۱. در ساختار لوویس آنیون‌های  $\text{XO}_3^-$  و  $\text{YO}_4^-$ ،  $\text{X}$  و  $\text{Y}$  به ترتیب به کدام گروه از جدول تناوبی می‌توانند تعلق داشته باشند؟ (با رعایت قاعده هشت‌تایی)

(۴) ۱۶ و ۱۷

(۳) ۱۴ و ۱۷

(۲) ۱۷ و ۱۴

(۱) ۱۵ و ۱۶

۲۲. کدام ترتیب برای انحلال گازها در آب صحیح است؟



۲۳. وقتی ۱۲/۰ گرم از مخلوط سدیم و پتاسیم با آب واکنش می‌دهد، ۵/۰ لیتر گاز هیدروژن در شرایط (دماه  ${}^{\circ}\text{C}$  و فشار atm) تولید می‌شود. جرم پتاسیم در این مخلوط چند گرم است؟ (جرم اتمی Na: ۲۳ و K: ۳۹)

(۴) ۴/۲۲

(۳) ۲/۴۹

(۲) ۷/۷۸

(۱) ۹/۵۱

۲۴. یک ترکیب شامل C، O، H، N و S است. در تجزیه عنصری یک نمونه ۵/۰۰ گرمی از این ترکیب، جرم C، N و S به ترتیب ۰/۴۴۴، ۰/۲۲۲ و ۱/۰۲۰ گرم به دست آمده است. فرمول تجربی این ترکیب کدام است؟



۲۵. در صورتی که پساب‌ها پیش از انتقال به رودخانه‌ها سرد نشوند، چه اتفاقی می‌افتد؟

(۱) کاهش ناگهانی سطح اکسیژن محلول در آب

(۲) حل شدن املاح در آب

(۳) فعال شدن برخی میکروب‌های خطرناک

(۴) رشد جلبک‌ها در آب



۲۶. pH محلول  $10^{-7}$  هیدروکلریک اسید در آب چقدر است؟


۶/۷۹ (۴)

۶/۹۹ (۳)

۷/۰۰ (۲)

۶/۰۰ (۱)

۲۷. ثابت تفکیک یک اسید دو ظرفیتی به ترتیب  $K_{a_1} = 10^{-3}$  و  $K_{a_2} = 10^{-6}$  است. اگر این اسید به صورت ذیل تفکیک شود، pH محلول  $1/10$  مولار این اسید در آب چقدر است؟




&lt; ۱ (۴)

۱ (۳)




۱/۵ (۲)

۲ (۱)

۲۸. با توجه به معادلات زیر مقدار عددی ثابت تعادل  $K$  برای واکنش  $\text{AgCl}_\gamma \rightleftharpoons \text{AgCl}(s) + \text{Cl}^-$  کدام است؟ (همه یون‌ها آبپوشیده هستند).

 $4 \times 10^{-6}$  (۴) $1/2 \times 10^{-11}$  (۳) $1/2 \times 10^{-11}$  (۲) $1/4 \times 10^{-5}$  (۱)

۲۹. با توجه به اطلاعات داده شده  $\Delta H^\circ$  واکنش  $\text{Na}_\gamma\text{O}(s) + \text{SO}_\gamma(g) \rightarrow \text{Na}_\gamma\text{SO}_\gamma(s)$  کدام است؟



-۵۸۰ kJ (۴)


+۲۵۵ kJ (۳)

-۴۳۵ kJ (۲)

+۵۳۱ kJ (۱)



۳۰. کدام یک از زوج‌های زیر محلول بافری تشکیل نمی‌دهد؟



۳۱. چگالی آب اقیانوس  $1/\cdot ۰\cdot ۴ \text{ g/cm}^3$  است. اگر در هر کیلوگرم آب اقیانوس فقط ۳۰ گرم  $\text{NaCl}$  حل شده باشد، مولاریته  $\text{NaCl}$  در آب اقیانوس چقدر است؟ (جرم اتمی  $\text{Cl} = ۳۵/۵$ ،  $\text{Na} = ۲۳$ ).


$$0/\cdot ۵۵ \quad (۴)$$

$$0/\cdot ۴۹ \quad (۳)$$

$$0/\cdot ۵۳ \quad (۲)$$

$$0/\cdot ۵۱ \quad (۱)$$

۳۲. با توجه به شکل زیر که پیشرفت یک واکنش فرضی گازی را در یک ظرف نیم لیتری نشان می‌دهد، سرعت متوسط واکنش بر حسب  $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$  کدام است؟ (هر مهره همارز ۱/۰۰ مول است).



۳۳. چه تعداد از عبارتهای زیر درست است؟

- در تأثیر یون پرمنگنات بر پارا زایلن، تغییر عدد اکسایش اتم کربن در گروه متیل ۶ است.
- واکنش پذیری متان ( $\text{CH}_4$ ) از سیلان بیشتر است.
- در  $\text{ZnCl}_2$ ، هر دو عنصر کلر و  $\text{Zn}$  به آرایش گاز نجیب رسیده‌اند.
- در شهرهای صنعتی نیم واکنش کاتدی فرایند خوردگی می‌تواند به صورت  $2\text{H}_2\text{O} + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$  باشد.
- با افزایش دما رنگ مخلوط تعادلی گازی  $\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$  تیره‌تر و ثابت تعادل آن کوچکتر می‌شود.


$$۱ \quad (۴)$$

$$۲ \quad (۳)$$

$$۴ \quad (۲)$$

$$۳ \quad (۱)$$

۳۴. ترکیب فرضی X به خوبی در آب حل نمی‌شود. اگر هر یک از گونه‌های داده شده در شکل زیر همارز ۰/۰۰۵ مول باشد، ثابت تعادل و pH محلول آبی زیر در شرایط مناسب به ترتیب کدامند؟ حجم ظرف ۲۰ لیتر است.



$$11/3, 5 \times 10^{-5} \quad (2)$$

$$11/7, 6/25 \times 10^{-6} \quad (4)$$

$$12/3, 4 \times 10^{-6} \quad (1)$$

$$11, 5 \times 10^{-10} \quad (3)$$

۳۵. محلولی از حل کردن ۰/۱۱۶۴ گرم از  $\text{Ce}(\text{NO}_3)_4$  با جرم مولکولی ۵۴۸/۳۰ گرم بر مول در ۰/۵۰ لیتر آب تهیه می‌شود. غلظت یون آمونیم در محلول حاصل برحسب ppm کدام است؟


$$2/30 \quad (4)$$

$$3/06 \quad (3)$$

$$11/9 \quad (2)$$

$$1/53 \quad (1)$$

۳۶. یک نمونه ۰/۰ گرمی از استیلن در حضور کاتالیزگر واکنش می‌دهد و بخشی از آن به بنزن تبدیل می‌شود:



پس از رسیدن گازها به تعادل در دمای K ۳۰۰ و فشار atm ۱، حجم نهایی گاز ۱۲/۰ لیتر است. چند درصد از استیلن اولیه به بنزن تبدیل شده است؟

$$55 \quad (4)$$


$$46 \quad (3)$$

$$29 \quad (2)$$

$$22 \quad (1)$$



۳۷. مجموع ضرایب واکنش زیر پس از موازنه کدام است؟




۲۵ (۴)

۳۱ (۳)

۳۹ (۲)

۳۵ (۱)

۳۸. با توجه به نیم واکنش های داده شده، با اعمال پتانسیل به پیل داده شده چه اتفاقی می افتد؟



(۱) با  $1/35$  ولت، در کاتد  $\text{Na}$  و در آند  $\text{Cl}_2$  تولید می شود.

(۲) با  $2/06$  ولت، در کاتد  $\text{O}_2$  و در آند  $\text{H}_2$  تولید می شود.

(۳) با  $2/06$  ولت، در کاتد  $\text{H}_2$  و در آند  $\text{O}_2$  تولید می شود.

(۴) با  $1/35$  ولت، در کاتد  $\text{Cl}_2$  و در آند  $\text{Na}$  تولید می شود.

۳۹. اگر  $E^\circ(\text{Cu}^+/ \text{Cu}^\cdot) = 0.52 \text{ V}$  و  $E^\circ(\text{Cu}^{\cdot+} / \text{Cu}^+) = 0.16 \text{ V}$  باشد، آیا نمک  $\text{Cu}^+$  در آب پایدار است؟

$$(E^\circ(\text{H}^+ / \text{H}_2) = 0 \text{ V} \quad E^\circ(\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) = 1.23 \text{ V})$$


(۱) بله.  $\text{Cu}^{\cdot+}$  و  $\text{Cu}^\cdot$  تبدیل می شود.

(۲) خیر.  $\text{Cu}^\cdot$  تبدیل می شود.


(۳) خیر.  $\text{Cu}^{\cdot+}$  تبدیل می شود.



۴۰. اگر در هر دو شکل a و b مقدار ۱۰ مول فلز نقره کاهش پیدا کند، اختلاف میان تغییر جرم تیغه‌های آهنی در این دو شکل چند گرم است؟ (جرم اتمی Fe: ۵۶، Ag: ۱۰۸)



(a)



(b)

۵/۲ (۲)

۱۰/۸ (۱)

۴) تغییر جرم هر دو تیغه یکسان است

۴/۲ (۳)

لطفا در این کادر چیزی نویسید.

# مرحله اول رالپیارم

۹۷-۹۸

مطابق توضیحات دفترچه تکمیل شود.

کد دفترچه

# شیوه کرد!

اسامی

سوزن هر لانی



حلیل جلالی

ماخ

غلط

صحیح

لطفا گزینه را به صورت کامل و فقط با مداد مشکی نرم پر کنید.

۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				

۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				

۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				
۴۶				
۴۷				
۴۸				
۴۹				
۵۰				

۶۱				
۶۲				
۶۳				
۶۴				
۶۵				
۶۶				
۶۷				
۶۸				
۶۹				
۷۰				

۱۱				
۱۲				
۱۳				
۱۴				
۱۵				
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				

۳۱				
۳۲				
۳۳				
۳۴				
۳۵				
۳۶				
۳۷				
۳۸				
۳۹				
۴۰				

۵۱				
۵۲				
۵۳				
۵۴				
۵۵				
۵۶				
۵۷				
۵۸				
۵۹				
۶۰				

۷۱				
۷۲				
۷۳				
۷۴				
۷۵				
۷۶				
۷۷				
۷۸				
۷۹				
۸۰				

محل امضاء

اینجانب ..... فرزند ..... با کد ملی .....

مطابقت اطلاعات مندرج در پاسخ برگ را با مشخصات خود تایید می نمایم.