



دفترچه سؤالات مرحله دوم

پانزدهمین دوره المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۳

مدت آزمون (دقیقه)	تعداد سؤالات	
	مسأله‌های تشریحی	سؤالات چند گزینه‌ای
۳۰۰	۸	-

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

توضیحات مهم


تذکرات آزمون:

ضمن آرزوی موفقیت برای شما دانش‌پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤالات آزمون به موارد زیر توجه کنید:

- این آزمون شامل ۸ مسأله‌ی تشریحی و وقت آن ۳۰۰ دقیقه است.
- استفاده از ماشین حساب در این آزمون غیر مجاز است.
- همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش) در طول زمان آزمون مجاز نیست.
- فقط داوطلبانی می‌توانند دفترچه‌ی سؤالات را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.
- انتشار و بازتولید این سؤالات توسط **کمیته‌ی اجرایی ماخ** انجام شده است.

۱- دایره‌ی اعداد (۱۵ نمره)

\mathbb{N} عدد حقیقی (۱) روی یک دایره نوشته شده‌اند. مجموع این اعداد ۱ است. از یک عدد دلخواه روی دایره شروع می‌کنیم و به ترتیب ساعت‌گرد، اعداد را می‌خوانیم. \mathbb{N} عدد خوانده شده را به ترتیب در $1^3, 2^3, \dots$ و n^3 ضرب می‌کنیم. این \mathbb{N} عدد را با هم جمع می‌کنیم. مثلاً در شکل زیر $\mathbb{N} = 4$ است.



اگر از عدد ۱ کار را آغاز کنیم، مجموع برابر

$$(1) \quad 1^3 + 1 \quad 2^3 + 0 \quad 3^3 + 1 \quad 4^3 = 71$$

می‌شود.

نشان دهید می‌توان از عددی بر روی دایره این کار را شروع کرد که نتیجه به دست آمده بزرگ‌تر یا مساوی $\frac{n^2}{4}$ باشد.

۲- نقشه‌ی قابل ساخت (۲۵ نمره)

در کشور عجایب تعدادی شهر، که یکی از آن‌ها پایتخت است، و تعدادی جاده وجود دارد که هر جاده دو شهر را به هم وصل می‌کند. می‌دانیم از هر شهر به پایتخت مسیری (شامل چند جاده و شهر میانی) وجود دارد. به زیرمجموعه‌ای از جاده‌ها یک «نقشه» می‌گوییم اگر دو شرط زیر را داشته باشد:

(الف) با این مجموعه از جاده‌ها از هر شهری مسیری به پایتخت موجود باشد.

(ب) با حذف هر یک از این جاده‌ها شرط «الف» دیگر برقرار نباشد.

در یک نقشه یک شهر غیر پایتخت را «تنها» می‌گوییم اگر با استفاده از جاده‌های این نقشه فقط به یکی از شهرهای دیگر جاده‌ی مستقیم داشته باشد. در یک نقشه فاصله‌ی هر شهر تا پایتخت برابر است با تعداد جاده‌های آن نقشه که باید طی کرد تا از آن شهر به پایتخت رسید. هزینه‌ی یک نقشه برابر مجموع فواصل شهرهای تنها تا پایتخت است.

یک نقشه «قابل ساخت» است اگر در بین همه‌ی نقشه‌ها کم‌ترین هزینه را داشته باشد. (ممکن است بیش از یک نقشه‌ی قابل ساخت داشته باشیم).

ثابت کنید نقشه‌ی قابل ساختی وجود دارد که بین هیچ کدام از شهرهای تنهای آن جاده‌ای (از بین جاده‌های نقشه یا سایر جاده‌ها) وجود ندارد.

۳- دوربین‌های عکاسی (۳۰ نمره)

شرکتی دوربین‌های عکاسی تولید می‌کند. هر مدل دوربین این شرکت با مجموعه‌ی قابلیت‌هایی که دارد شناخته می‌شود (یعنی دو دوربین با یک مجموعه‌ی قابلیت، از یک مدل محسوب خواهند شد و برعکس). مجموعه‌ی کل قابلیت‌هایی که یک دوربین می‌تواند داشته باشد برابر با مجموعه‌ی $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ است.

در سال اول تأسیس، این شرکت دوربین‌های مدل X_1, X_2, \dots, X_m را به بازار ارائه داد که به ترتیب دارای مجموعه‌ی قابلیت‌های A_1, A_2, \dots, A_m بودند. برای این که تمام مدل‌ها دارای جذابیت مخصوص به خود باشند، هیچ‌کدام از این مدل‌ها تمام قابلیت‌های یک مدل دیگر را دارا نبود (یعنی اگر $A_i \subset A_j$ آن‌گاه $i = j$).

در سال دوم این شرکت تصمیم گرفت مجموعه‌ای از مدل‌ها را از روی مدل‌های ارائه شده در سال اول طراحی کند و به بازار ارائه کند. روش به این گونه بود که هر مدلی مثل Y با مجموعه‌ی قابلیت‌های B که دارای دو شرط زیر بود به بازار ارائه شد.

(۱) به ازای هر مدل سال قبل مثل X_i باید Y حداقل یکی از قابلیت‌های X_i را دارا باشد. (یعنی $B \cap A_i \neq \emptyset$).

(۲) به ازای هر زیرمجموعه از B مثل B' که $B \neq B'$ ، مدلی که با قابلیت‌های B' تعیین می‌شود دارای شرط اول نباشد.

این شرکت همان‌طور که مجموعه‌ی مدل‌های سال دوم را از روی مدل‌های سال اول طراحی کرد، دقیقاً با همین روش مجموعه‌ی مدل‌های سال سوم را از روی مجموعه‌ی مدل‌های سال دوم طراحی کرد. ثابت کنید که مجموعه‌ی مدل‌های سال اول و سوم عیناً مانند هم است.

۴- جای‌گشت‌ها (۳۰ نمره)

تعریف: یک جای‌گشت از اعداد ۱ تا n ترتیبی از اعداد ۱ تا n است که هر کدام از این اعداد دقیقاً یک‌بار در این ترتیب ظاهر شده است. (مثلاً $\langle 4, 3, 1, 2 \rangle$ یک جای‌گشت از اعداد ۱ تا ۴ است).

بر روی جای‌گشت $P = \langle p_1, p_2, \dots, p_{2k}, p_{2k+1} \rangle$ از اعداد ۱ تا $2k + 1$ تنها دو عمل زیر را می‌توانیم انجام دهیم:

چرخش سر: با حرف s نمایش داده می‌شود که جای‌گشت P را به جای‌گشت $\langle p_{2k}, p_1, p_2, p_{2k-1}, p_{2k+1} \rangle$ تبدیل می‌کند.

چرخش دم: با حرف d نمایش داده می‌شود که جای‌گشت P را به جای‌گشت $\langle p_1, p_{2k+1}, p_2, p_3, \dots, p_{2k} \rangle$ تبدیل می‌کند.

می‌خواهیم بدانیم با دو عمل بالا، چند تا از جای‌گشت‌های اعداد ۱ تا $2k + 1$ را می‌توان مرتب کرد. برای مثال جای‌گشت $\langle 4, 2, 3, 1, 5 \rangle$ (در این حالت $k = 2$ است) به صورت زیر مرتب می‌شود:

$$\langle 4, 2, 3, 1, 5 \rangle \xrightarrow{d} \langle 4, 5, 2, 1, 3 \rangle \xrightarrow{a} \langle 1, 4, 5, 2, 3 \rangle \xrightarrow{d} \langle 1, 3, 4, 5, 2 \rangle \xrightarrow{d} \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$$

تعداد جای‌گشت‌های قابل مرتب شدن را به صورت یک فرمول برحسب k به دست آورید. این فرمول را در بالای برگه‌ی جواب به صورت واضح بنویسید و سپس گفته‌ی خود را اثبات کنید.

۵- صفر پاک کن (۲۰ نمره)

اعداد ۱ تا $100,000$ را پشت سر هم و با یک فاصله‌ی خالی بین هر دو عدد بر روی کاغذ می‌نویسیم. سپس رقم‌های صفر آن‌ها را پاک می‌کنیم (یعنی آن‌ها را با فاصله‌ی خالی جای‌گزین می‌کنیم). توجه کنید که ممکن است با این کار از یک عدد تعدادی عدد دیگر تولید شوند: مثلاً از 70090 دو عدد 7 و 9 تولید می‌شوند. جمع اعداد حاصل چند است؟ نحوه‌ی محاسبه‌ی خود را به دقت و طی مراحل مشخص نشان دهید.

۶- مجموعه‌ها (۲۵ نمره)

فرض کنید که مجموعه‌های r عضوی A_1, A_2, \dots, A_n و B_1, B_2, \dots, B_n به گونه‌ای هستند که: $A_i \cap B_i = \emptyset$ اگر و تنها اگر $i=j$.

فرض کنید که مجموعه‌ی X از اجتماع تمام این مجموعه‌ها تشکیل شده باشد (یعنی $X = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cup B_i)$). هر جای‌گشتی از اعضای X را به صورت $\langle x_1, \dots, x_m \rangle$ نشان می‌دهیم (یک جای‌گشت از یک مجموعه یک ترتیب از اعضای آن است که هر عضوی از مجموعه دقیقاً یک بار در آن ظاهر شده است).

اگر A و B هر دو زیرمجموعه‌ی X و مجزا از یکدیگر باشند (یعنی $A \cap B = \emptyset$), تعریف می‌کنیم که جای‌گشت $???$ از X زوج مرتب (A, B) را تقسیم می‌کند، اگر و تنها اگر به ازای هر $a \in A$ و هر $b \in B$, جایی که a در P ظاهر شده است قبل از جایی باشد که b ظاهر شده است (یعنی اگر $x_i = a$ و $x_j = b$ در آن صورت $i < j$).

(الف) ثابت کنید امکان ندارد i و j وجود داشته باشند که $i \neq j$ باشد و جای‌گشت P از اعضای X یافت شود به طوری که جای‌گشت P زوج مرتب‌های (A_i, B_i) و (A_j, B_j) را تقسیم کند. (۱۰ نمره)

(ب) ثابت کنید $\binom{2n}{r} \cdot n$. (۱۵ نمره)

۷- مدار منطقی (۲۵ امتیاز)

یک متغیر منطقی مانند a متغیری است که تنها مقادیر 0 و 1 را می‌پذیرد. دستگاهی داریم که $n+1$ متغیر منطقی $(0 \ i \ n)$ و $n+1$ متغیر منطقی $(0 \ i \ n)$ به آن وارد می‌شوند و یک متغیر منطقی Γ از آن خارج می‌شود. به ازای هر $0 \ i \ n$ داریم $x_i = 1, y_i = 1$ در ضمن همیشه $x_i = 0$ و $y_i = 0$ است. اگر دست‌کم دو تا از متغیرهای x_i مقدار 1 داشته باشند، $r = 1$ و در غیر این صورت $r = 0$ خواهد بود.

دو نوع قطعه‌ی منطقی داریم که در ساخت این دستگاه از آن استفاده شده است. هر کدام از این قطعات دو ورودی و یک خروجی دارند. خروجی قطعه‌ی از نوع A تنها وقتی 1 است که هر دو ورودی 1 باشد. حال آن‌که خروجی قطعه‌ی از نوع B تنها وقتی 0 است که هر دو ورودی 0 باشد.

در ساخت این دستگاه از K قطعه استفاده کرده‌ایم که با شماره‌های ۱ تا K نشان داده می‌شوند. هر یک از ورودی‌های یک قطعه می‌تواند از ورودی‌های دستگاه (یعنی x_i ها و y_i ها) یا خروجی قطعات قبلی (با شماره کوچک‌تر) باشد. در ضمن خروجی دستگاه (همان r) خروجی آخرین قطعه است.

به عنوان مثال، ورودی‌های قطعه شماره ۱ ممکن است x_1 و y_1 باشند. قطعه‌ی شماره ۲ ممکن است ورودی‌هایش x_1 و خروجی قطعه‌ی شماره ۱ باشند. قطعه‌ی شماره ۳ نیز ممکن است ورودی‌هایش را از خروجی قطعات ۱ و ۲ بگیرد.

الف) ثابت کنید که عدد $i \leq n$ و دو قطعه‌ی P و Q وجود دارند به طوری که هر یک از دو قطعه‌ی P و Q حداقل یکی از ورودی‌هایشان را از مجموعه‌ی $\{x_i, y_i\}$ می‌گیرند. (۱۵ نمره)

ب) نشان دهید که $4 \leq 2n - k$. (۱۰ نمره)

۸- **ماگ** جدول‌های ستون متعادل (۳۰ نمره)

یک جدول $n \times m$ (دارای n سطر و m ستون) از اعداد صفر و یک «ستون متعادل» است، اگر هر دو ستون مجزا از آن را که کنار هم قرار دهیم، تعداد زوج‌های $00, 01, 10$ و 11 که در سطرهاى مختلف از این دو ستون قرار دارند برابر باشند. مثلاً جدول زیر ستون متعادل است زیرا اگر ستون ۱ و ۲ یا ۲ و ۳ و ۳ و ۱ را در کنار هم قرار دهیم، از هر زوج $00, 01, 10$ و 11 یکی تولید می‌شود.

۰	۰	۰
۱	۰	۱
۱	۱	۰
۰	۱	۱

الف) به ازای هر $k \geq 3$ یک جدول ستون متعادل $(2^k - 1) \times 2^k$ بسازید. (دارای 2^k سطر و $2^k - 1$ ستون) (۱۵ نمره)

ب) می‌دانیم هیچ جدول ستون متعادل $(2^k + 1) \times 2^k$ وجود ندارد. حال ثابت کنید هیچ جدول ستون متعادل $2^k \times 2^k$ نیز نمی‌توان ساخت. (۱۵ نمره)